

Journée internationale de prévention des overdoses - Jeudi 31 août 2017

Des moyens de prévention efficaces existent pour lutter contre les décès par overdose

Massy, le 31 août 2017 - A l'occasion de la Journée internationale de prévention des overdoses, Indivior, laboratoire spécialisé dans le traitement de l'addiction aux opioïdes, se joint aux associations de patients, à leur entourage, aux professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des addictions et aux autorités de santé publique dans une démarche de sensibilisation et de prévention des overdoses.

Les personnes dépendantes aux opioïdes constituent le groupe le plus exposé aux overdoses. Selon l'OMS, on estime qu'à l'échelle mondiale 69 000 personnes meurent chaque année d'une overdose aux opioïdes¹. Il s'agit de la principale cause de décès des usagers problématiques de drogues en Europe².

En France, la consommation d'opioïdes est impliquée dans 86 % des décès par overdose en France³. Selon l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, le nombre d'usagers d'opiacés en France est estimé à 220 000 individus en 2013⁴. Selon l'enquête DRAMES réalisée en 2015⁵ (recueil annuel de données sur les cas de décès liés à l'usage abusif de médicaments et de substances psychoactives), le nombre de décès par overdose aux opioïdes est estimée à environ 340, soit près de 1 décès par jour.

« La Journée internationale de sensibilisation à l'overdose est déterminante pour informer sur la prévention et le traitement d'urgence de l'overdose. Depuis plus de 20 ans, Indivior s'engage à améliorer la prise en charge des addictions aux opioïdes à travers le développement de solutions thérapeutiques adaptées. Une approche thérapeutique intégrée combinant traitement et accompagnement psychologique et social permettront de rompre le cycle des rechutes. L'objectif est de favoriser une réadaptation sociale et une meilleure qualité de vie », souligne Dr Mohamed Farah, Directeur Médical, Indivior France.

Indivior a obtenu le 28 juillet 2017 une autorisation de mise sur le marché pour NALSCUE[®], premier spray nasal de naloxone pour le traitement d'urgence des overdoses aux opioïdes. Ce dispositif prêt à l'emploi et facile d'utilisation permet de traiter immédiatement des cas d'overdose par une personne témoin avant l'intervention des secours. Ce nouvel outil de réduction des risques répond aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé qui préconise un usage communautaire large de la naloxone, directement auprès des usagers et de leur entourage pour la rendre accessible aux personnes à risque. En effet, un professionnel de santé est rarement présent lors d'une overdose.

« L'accès à NALSCUE® comme traitement d'urgence des overdoses aux opioïdes peut également constituer pour les usagers l'occasion d'une première rencontre avec le système de soins », souligne Pierre Chappard, Président de PsychoActif, communauté en ligne dédiée à l'information, l'entraide et l'échange d'expériences sur les drogues, dans une optique de réduction des risques.

Plus largement, l'accès aux traitements de l'addiction aux opioïdes associés à un accompagnement psychosocial des patients ont été des stratégies efficaces pour réduire la mortalité par overdose. La mortalité par overdose aux opioïdes a diminué. Elle est passée d'environ 560 décès par an estimés en 1994⁶ avant la mise à disposition des traitements de substitution à environ 340 décès par an en 2015⁵.

Toutefois, selon les données de l'OFDT, environ 50 000 usagers d'opioïdes ne sont pas traités en France.

Les troubles liés à la consommation d'opioïdes relèvent d'une maladie chronique ayant une incidence majeure sur la qualité de vie des patients car elle affecte leur quotidien, leur environnement familial⁷ et leur vie professionnelle⁸. La stigmatisation et la marginalisation des patients souffrant d'addiction constituent toujours un obstacle considérable à l'accès aux soins⁹.

Indivior travaille en étroite collaboration avec différents acteurs impliqués pour que l'addiction aux opioïdes soit reconnue comme une maladie chronique avec risque de rechutes et pour laquelle une prise en charge pluridisciplinaire permettra d'accompagner les patients à toutes les étapes clés de leur chemin vers une meilleure qualité de vie.

À propos des troubles liés à la consommation d'opioïdes

Selon le Manuel Diagnostique et Statistique des troubles mentaux, cinquième édition (DMS-5)¹⁰, l'addiction aux opioïdes se caractérise par le besoin impérieux et irrésistible de consommer la substance, la perte de contrôle sur le temps dédié à la prise de substance, l'augmentation de la tolérance au produit addictif, la présence d'un syndrome de sevrage, c'est-à-dire de l'ensemble des symptômes provoqués par l'arrêt brutal de la consommation, l'incapacité de remplir des obligations importantes, l'usage même lorsqu'il y a un risque physique, des problèmes personnels ou sociaux, le désir persistant ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l'utilisation de cette substance, la poursuite de la consommation malgré les dégâts physiques ou psychologiques. Ces symptômes traduisent une consommation compulsive et prolongée de produits opioïdes utilisés sans raison médicale légitime ou, dans l'éventualité d'une autre affection médicale nécessitant un traitement à base d'opioïdes, ces derniers sont utilisés à des doses nettement supérieures à la posologie recommandée pour le traitement de cette affection médicale.

À propos d'Indivior

Indivior est un laboratoire pharmaceutique international entièrement dédié à la recherche, au développement et à la commercialisation de traitements qui ont révolutionné la prise en charge de l'addiction et plus particulièrement de la dépendance aux opioïdes. Le nom du laboratoire est la contraction en anglais des termes individu et initiative.

Son objectif est de transformer la prise en charge des addictions pour évoluer d'une situation de crise sociale humaine vers la reconnaissance d'une pathologie chronique qui peut être traitée. Indivior développe de nouvelles solutions innovantes pour faciliter un large accès aux soins et améliorer la qualité de vie de tous les patients usagers souffrant d'une addiction aux substances psychoactives. Indivior dispose d'un portefeuille de produits candidats dans le traitement des addictions aux opioïdes et visant d'autres pathologies chroniques dans l'addiction et comorbidités associées, telles que la dépendance à l'alcool et la schizophrénie. Basé à Richmond aux Etats-Unis, Indivior est présent dans plus de 40 pays et emploie plus de 900 personnes dans le monde. Pour en savoir plus, consultez notre site www.indivior.com

Contacts presse

Anne-Laure Brisseau : al.brisseau@ljcom.net / 01 45 03 50 36

Maryam De Kuyper : m.dekuyper@ljcom.net / 01 45 03 89 94

Références

¹ Organisation Mondiale de la Santé, Community Management of opioid overdose. 2014

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137462/1/9789241548816_eng.pdf?ua=1&ua=1

² Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Rapport européen sur les drogues : tendances et évolutions. 2017. <http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001ENN.pdf>.

³ Enquête DRAMES 2013.

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/8d771d0016c578afde85ab10849b7a22.pdf

⁴ Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Rapport national 2016, Usages de substances illicites en populations générale et spécifiques, France, 2016.

⁵ Enquête DRAMES 2015.

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/01c99bad61b61c11e17ed6c81cb86eb4.pdf

⁶ Observatoire français des drogues et des toxicomanies. France drug situation 2001.

<https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efnxofic.pdf>

⁷ Cicek E, Demirel B, Ozturk HI, et al. Psychiatr Danub. 2015;27(3):273–77.

⁸ Organisation mondiale de la santé. Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence. 2009. Disponible sur : http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf.

⁹ Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Rapport européen sur les drogues : tendances et évolutions. 2017. <http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001ENN.pdf>.

¹⁰ Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième édition. Disponible sur : <http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx>

LES CHIFFRES

L'OVERDOSE AUX OPIOÏDES EST LA PRINCIPALE CAUSE DE DÉCÈS DES USAGERS EN FRANCE⁷



ENVIRON 340 DÉCÈS
PAR OVERDOSE EN
2015¹



ÂGE : 36

MOYENNE D'ÂGE
AYANT LE RISQUE LE
PLUS ÉLEVÉ DE
DÉCÈS PAR
OVERDOSE¹ :



86 %

POURCENTAGE DE
DÉCÈS PAR OVERDOSE
LIÉ À LA
CONSOMMATION
D'OPIOÏDES²



220 000


NOMBRE D'USAGERS
D'OPIACÉS EN FRANCE
EN 2013³



LES TROUBLES LIÉS À LA
CONSOMMATION D'OPIOÏDES
ONT UN IMPACT MAJEUR SUR
LA VIE DES PATIENTS :


- ILS AFFECTENT LEUR QUOTIDIEN
- ILS PERTURBENT LEUR ENVIRONNEMENT FAMILIAL⁴
- ILS ONT DES RÉPERCUSSIONS SUR LEUR VIE PROFESSIONNELLE⁵

LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE DÉCÈS PAR OVERDOSE LIÉS AUX OPIOÏDES EST UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE



UNE PRISE EN CHARGE EFFICACE
DOIT ASSOCIER :^{6,7}

- UN TRAITEMENT DE L'ADDICTION AUX OPIOÏDES
- UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL



ENVIRON
50 000

PERSONNES SOUFFRANT DE
TROUBLES LIÉS À LA
CONSOMMATION D'OPIOÏDES
EN FRANCE NE SONT PAS
TRAITÉES³



LE SEVRAGE OU L'ARRÊT DE LA
PRISE EN CHARGE ET EN
PARTICULIER DU TRAITEMENT
EXPOSET LES PATIENTS À
DES RISQUES PLUS
IMPORTANTES D'OVERDOSE⁸

LE TRAITEMENT DE L'ADDICTION AUX OPIOÏDES (TAO) EST EFFICACE POUR RÉDUIRE LE NOMBRE DE DÉCÈS LIÉS À LA CONSOMMATION DE DROGUE LORSQUE LE TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX EST ADMINISTRÉ À DES DOSES ADAPTÉES ET SUIVI À LONG TERME.^{8,9} LES TAO SONT À BASE DE BUPRÉNORPHINE ET DE MÉTHADONE⁴

L'OVERDOSE NE FAIT PAS DE DISTINCTION : ELLE PEUT SURVENIR CHEZ UN AMI OU UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE. VOUS POUVEZ AIDER À COMBATTRE LE FLÉAU DES DÉCÈS PAR OVERDOSE EN ENCOURAGEANT TOUTE PERSONNE À RISQUE À EN PARLER À SON MÉDECIN DÈS AUJOURD'HUI.

RÉFÉRENCES :

1 ENQUÊTE DRAMES 2015. [HTTP://ANSM.SANTE.FR/VAR/ANSM_SITE/STORAGE/ORIGINAL/APPLICATION/01C99BAD61B61C11E17ED6C81CB86EB4.PDF](http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/01c99bad61b61c11e17ed6c81cb86eb4.pdf) 2 ENQUÊTE DRAMES 2013. [HTTP://ANSM.SANTE.FR/VAR/ANSM_SITE/STORAGE/ORIGINAL/APPLICATION/8D771D0016C578AFDE85AB10849B7A22.PDF](http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/8d771d0016c578afde85ab10849b7a22.pdf) 3 OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES. RAPPORT NATIONAL 2016, USAGES DE SUBSTANCES ILLICITES EN POPULATIONS GÉNÉRALE ET SPÉCIFIQUES, FRANCE, 2016. 4 CICEK E, DEMIREL B, OZTURK HI, ET AL. PSYCHIATR DANUB. 2015 ; 27 3 :273 77. 5 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. GUIDELINES FOR THE PSYCHOSOCIALLY ASSISTED PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF OPIOID DEPENDENCE. 2009. DISPONIBLE SUR : [HTTP://WWW.WHO.INT/SUBSTANCE_ABUSE/PUBLICATIONS/GUIDELINES_OPIOID_DEPENDENCE_2009/EN/](http://www.who.int/substance_abuse/publications/guidelines_opioid_dependence_2009/en/). DOCUMENT CONSULTÉ LE 28 MAI 2010. 6 OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES. PERSPECTIVES ON DRUGS: PREVENTING OVERDOSE DEATHS IN EUROPE. 2017. DISPONIBLE SUR : [HTTP://WWW.EMCDDA.EUROPA.EU/PUBLICATIONS/PODS/PREVENTING_OVERDOSE_DEATHS](http://www.emcdda.europa.eu/publications/pods/preventing-overdose-deaths). DOCUMENT CONSULTÉ EN JUIN 2017. 7 OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES. RAPPORT EUROPÉEN SUR LES DROGUES : TENDANCES ET ÉVOLUTIONS. 2017. [HTTP://WWW.EMCDDA.EUROPA.EU/PUBLICATIONS/EDR/TRENDS_DEVELOPMENTS/2017](http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2017). DOCUMENT CONSULTÉ EN JUIN 2017. 8 PIERCE, M, BIRD, S. M, HICKMAN, M, ET AL. ADDICTION. 2016 9 DEGENHARDT, L, RANDALL, D, HALL, W, ET AL. DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE 2009 ; 105: 9 15.